

Cualtacciu E13

Vass7R09s181-185



Collection Vassal-Montpellier

OMp2189

OMp2189  
CUALTACCIU E13  
FR 7 R 9 s 181-185


Cualtacciu E13

IFV


sept. 2015

Clos 82 R7 s 181-290





















(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Nom Var : Cualtacciu

Emplacement : **Vass7R09s181-185**

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
<b>Oiv 301</b>	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
<b>Oiv 302</b>	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
<b>Oiv 303</b>	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
<b>Oiv 304</b>	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
<b>Oiv 305</b>	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
<b>Oiv 306</b>	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

<b>Oiv 351</b>	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
<b>Oiv 352</b>	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

*un peu faible - pour les bourgeons dans filets*

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	3		21/3	0	
2	3		6/4	1	
3	4	gout 20/3; 10/4	3/4	2	
4	4	gout 21/3 20/3	27/3	1	
5	4	21/3 gout 23/3	3/4	2 ds filets	
Moyenne	18		2/04 +5	6	3

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début août (oiv 306)
17/5	21/5 -3		16/07	20/07 +1	24/08 +2	

Dates	10/08	11/08	24/08	
IR	19,5°	12,6 23,2	20,4 Bouée 5/11	
Valeur papier PH		20,0 sur papier		

Remarque :



**Formulaire de description 2 / 8**  
(stade floraison)

Année : 2015 (+ 2016 confirmation)

Observateur : LACONBE

Code cépage : 3050

Code introduction : OIV 2189

Nom introduction : COALTACCIU E13

Emplacement :

7R7 181-185 jeune

**BOURGEONNEMENT**

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
<b>Oiv 001</b>	Ouverture de l'extrémité	fermé (globuleuse)	demi-ouverte	complètement ouverte		
Oiv 002	Distribution de la pigmentation anthocyanique des poils couchés de l'extrémité	1-absente	2- en liseré	3-partout		
<b>Oiv 003</b>	intensité de la pigmentation anthocyanique des poils couchés de l'extrémité	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
<b>Oiv 004</b>	densité des poils couchés de l'extrémité	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 005	densité poils dressés de l'extrémité	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte

**JEUNES FEUILLES**

<b>Oiv 051</b>	couleur de la face supérieure du limbe (4° feuille)	1- verte	2- jaune	3- bronzées	4. cuivrées rougeâtre	
<b>Oiv 053</b>	densité poils couchés entre nervures principale face inf. (4° feuille)	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
<b>Oiv 054</b>	densité poils dressés entre nervures principale face inf. (4° feuille)	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 055	densité poils couchés sur nervures principale face inf. (4° feuille)	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 056	densité poils dressés sur nervures principale face inf. (4° feuille)	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte

**JEUNES FEUILLES DU HAUT (3 PREMIERES DETACHEES)**

000-28	Profil	1. étalées	2. en gouttière	3. autres		
000-29	Densité poils couchés face inf	nulle ou très faible 299	faible 202	moyenne 203	très forte 204	
000-30	Densité poils dressés face inf	nulle ou très faible 280	moyenne 200	très forte 201		
000-31	Densité poils couchés face sup	nulle ou très faible 1	faible 3	moyenne 5	forte 7	très forte 9.
000-32	Densité poils dressés face sup	nulle ou très faible 1	faible 3	moyenne 5	forte 7	très forte 9.
000-33	Couleur face sup.	blanc 205	fauve roux 206	carminé 207	liseré carminé 208	jaune 209
		plages bronzées ou cuivrées 210			vertes 212	autre 213

**JEUNES FEUILLES DU BAS (3 SUIVANTES)**

000-34	Profil	plan 1	en gouttière 2	involuté 3	révoluté 4	tourmenté 5
000-35	Densité poils couchés face inf	nulle ou très faible 285	faible 223	moyenne 224	très forte 225	
000-36	Densité poils dressés face inf	nulle ou très faible 284	moyenne 215	très forte 216		
000-37	Densité poils couchés nervure face inf	nulle ou très faible 283	faible 217	moyenne 218	très forte 219.	
000-38	Densité poils dressés nervure face inf	nulle ou très faible 282	moyenne 215	très forte 216		
000-39	Densité poils couchés face sup	nulle ou très faible 1	faible 3	moyenne 5	forte 7	très forte 9.
000-40	Densité poils dressés face sup	nulle ou très faible 1	faible 3	moyenne 5	forte 7	très forte 9.
000-41	Couleur face sup.	blanc 226	fauve roux 227	carminé 228	liseré carminé 229	jaune 230
		plages bronzées ou cuivrées 231			entièrement bronzées ou cuivrées 232	vertes 233



**Formulaire de description 2 / 8**  
(stade floraison)

Année : 2015 + 2016

Observateur : LACOTBE

Code cépage :

Code introduction :

Nom introduction : CUATACCIU E13

Emplacement : Espiguet 86 R2 s 221-230

**BOURGEONNEMENT**

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
<b>Oiv 001</b>	Ouverture de l'extrémité	fermé (globuleuse)	demi-ouverte	complètement ouverte		
<b>Oiv 002</b>	Distribution de la pigmentation anthocyanique des poils couchés de l'extrémité	1-absente	2- en liseré	3-partout		
<b>Oiv 003</b>	intensité de la pigmentation anthocyanique des poils couchés de l'extrémité	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
<b>Oiv 004</b>	densité des poils couchés de l'extrémité	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
<b>Oiv 005</b>	densité poils dressés de l'extrémité	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte

**JEUNES FEUILLES**

<b>Oiv 051</b>	couleur de la face supérieure du limbe (4° feuille)	1- verte	2- jaune	3- bronzées	4. cuivrées rougeâtre	
<b>Oiv 053</b>	densité poils couchés entre nervures principale face inf. (4° feuille)	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
<b>Oiv 054</b>	densité poils dressés entre nervures principale face inf. (4° feuille)	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
<b>Oiv 055</b>	densité poils couchés sur nervures principale face inf. (4° feuille)	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
<b>Oiv 056</b>	densité poils dressés sur nervures principale face inf. (4° feuille)	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte

**JEUNES FEUILLES DU HAUT (3 PREMIERES DETACHEES)**

000-28	Profil	1. étalées	2. en gouttière	3. autres		
000-29	Densité poils couchés face inf	nulle ou très faible 299	faible 202	moyenne 203	très forte 204	
000-30	Densité poils dressés face inf	nulle ou très faible 280	moyenne 200	très forte 201.		
000-31	Densité poils couchés face sup	nulle ou très faible 1	faible 3	moyenne 5	forte 7	très forte 9.
000-32	Densité poils dressés face sup	nulle ou très faible 1	faible 3	moyenne 5	forte 7	très forte 9.
000-33	Couleur face sup.	blanc 205	fauve roux 206	carminé 207	liseré carminé 208	jaune 209
		plages bronzées ou cuivrées 210			vertes 212	autre 213

**JEUNES FEUILLES DU BAS (3 SUIVANTES)**

000-34	Profil	plan 1	en gouttière 2	involuté 3	révoluté 4	tourmenté 5
000-35	Densité poils couchés face inf	nulle ou très faible 285	faible 223	moyenne 224	très forte 225	
000-36	Densité poils dressés face inf	nulle ou très faible 284	moyenne 215	très forte 216		
000-37	Densité poils couchés nervure face inf	nulle ou très faible 283	faible 217	moyenne 218	très forte 219.	
000-38	Densité poils dressés nervure face inf	nulle ou très faible 282	moyenne 215	très forte 216		
000-39	Densité poils couchés face sup	nulle ou très faible 1	faible 3	moyenne 5	forte 7	très forte 9.
000-40	Densité poils dressés face sup	nulle ou très faible 1	faible 3	moyenne 5	forte 7	très forte 9.
000-41	Couleur face sup.	blanc 226	fauve roux 227	carminé 228	liseré carminé 229	jaune 230
		plages bronzées ou cuivrées 231			entièrement bronzées ou cuivrées 232	vertes 233

Ne début Eutypise sur 1 souche / 40  
idem 2° emplacement : 3 souches / 10



**Formulaire de description 3/8**  
(Stade floraison)

Année :

Code cépage **3050**

Code introduction : **011p2189**

Observateur :

**+ 7R7-181-185**

Nom introduction : **CWALTACCIU E13**

Emplacement : **7R09-181-185**

**Rameau herbacé**

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
<b>Oiv 006</b>	Port	érigé	<u>demi érigé</u>	horizontal	demi retombant	retombant
<b>Oiv 351</b>	Vigueur du rameaux	très faible	faible	<u>moyen</u>	forte	très forte
<b>Oiv 007</b>	Couleur face dorsale entrenoeuds	<u>1- verte</u>	2- verte et rouge	3- rouge		
Oiv 009	Couleur face dorsale noeuds	<u>1- verte</u>	2- verte et rouge	3- rouge		
<b>Oiv 008</b>	Couleur face ventrale entrenoeuds	<u>1- verte</u>	2- verte et rouge	3- rouge		
Oiv 010	Couleur face ventrale noeuds	<u>1- verte</u>	2- verte et rouge	3- rouge		
Oiv 014	Densité poils couchés entrenoeuds	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 013	Densité poils couchés noeuds	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 012	Densité poils dressés entrenoeuds	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 011	Densité poils dressés noeuds	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 015-2	Intensité pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons	<u>nulle ou très faible</u>	faible	moyenne	forte	très forte
<b>Oiv 016</b>	Distribution vrilles	<u>1- 2 ou moins</u>	2- 3 ou plus			
Oiv 017	longueur vrilles Valeur absolue (en cm) : <b>15</b>	très courtes (<10cm)	<u>courtes (15cm)</u>	moyennes (20cm)	longues (25cm)	très longues (>30cm)

**Inflorescence**

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
<b>Oiv 151</b>	Sexe de la fleur	1- mâle	2- mâle à hermaphrodite	<u>3- hermaphrodite</u>	4- femelle à étamines réflexes	
Oiv 152	Niveau insertion 1° inflorescence	1- jusqu'au 2° noeud	<u>2- 3° et 4° noeud</u>	3- a partir du 5° noeud		
Oiv 153	Nombre inflorescence/rameau	<u>1- 1 ou moins</u>	2- 1,1 à deux	3- 2,2 à trois	4- plus de trois	
<b>Oiv 155</b>	Fertilité des bourgeons de la base	très faible		<u>moyenne</u>		très élevée
Oiv 501	Taux de nouaison	très faible (<10%)	faible 20%	moyen 40%	élevé 60%	très élevé (=>80%)

**Vassal**

000-42	Relief surface du rameau herbacé	1- unie	<u>2- côtelée</u>		
000-10	Villosité spéciale du rameau herbacé	1- épines ou analogues	2- poils massifs	<u>3- aucune</u>	
000-21	Couleur des vrilles	1- jaune	2- rouge clair	3- rouge foncé	<u>4- vert</u>
000-43	Taille du bouton floral	1- petit	<u>2- moyen</u>	3- gros	



**Formulaire de description 3/8**  
(Stade floraison)

Année : 2015 + 2016

Observateur :

Code cépage

Code introduction :

Nom introduction : QWALTACCIU E13

Emplacement :

**Rameau herbacé**

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 006	Port	érigé	demi érigé	horizontal	demi retombant	retombant
Oiv 351	Vigueur du rameaux	très faible	faible	moyen	forte	très forte
Oiv 007	Couleur face dorsale entrenoeuds	1- verte	2- verte et rouge	3- rouge		
Oiv 009	Couleur face dorsale noeuds	1- verte	2- verte et rouge	3- rouge		
Oiv 008	Couleur face ventrale entrenoeuds	1- verte	2- verte et rouge	3- rouge		
Oiv 010	Couleur face ventrale noeuds	1- verte	2- verte et rouge	3- rouge		
Oiv 014	Densité poils couchés entrenoeuds	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 012	Densité poils couchés noeuds	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 013	Densité poils couchés noeuds	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 011	Densité poils dressés noeuds	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 015-2	Intensité pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 016	Distribution vrilles	1- 2 ou moins	2- 3 ou plus			
Oiv 017	longueur vrilles Valeur absolue (en cm) : 15	très courtes (<10cm)	courtes (15cm)	moyennes (20cm)	longues (25cm)	très longues (>30cm)

**Inflorescence**

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 151	Sexe de la fleur	1- mâle	2- mâle à hermaphrodite	3- hermaphrodite	4- femelle à étamines réflexes	fin - flo
Oiv 152	Niveau insertion 1° inflorescence	1- jusqu'au 2° noeud	2- 3° et 4° noeud	3- a partir du 5° noeud		
Oiv 153	Nombre inflorescence/rameau	1- 1 ou moins	2- 1,1 à deux	3- 2,2 à trois	4- plus de trois	
Oiv 155	Fertilité des bourgeons de la base	très faible		moyenne		très élevée
Oiv 501	Taux de nouaison	très faible (<10%)	faible 20%	moyen 40%	élevé 60%	très élevé (=>80%)

**Vassal**

000-42	Relief surface du rameau herbacé	1- unie	2- côtelée		
000-10	Villosité spéciale du rameau herbacé	1- épines ou analogues	2- poils massifs	3- aucune	
000-21	Couleur des vrilles	1- jaune	2- rouge clair	3- rouge foncé	4- vert
000-43	Taille du bouton floral	1- petit	2- moyen	3- gros	



Formulaire de description 4 / 8  
Observation entre stades de nouaison et de véraison

Année : 2015  
Code cépage : 3050  
Nom introduction : CUALTACCIU E13  
Observateur : LACATTE  
Code introduction : OMLp2189  
Emplacement : 7R09 1181-185

LIMBE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 065	Taille du limbe	très petite	<u>petite</u>	moyenne	grande	très grande
Oiv 067	Forme du limbe <i>Large</i>	1-cordiforme	2-cunéiforme	3-pentagon.	<u>4-orbicul</u>	5-rénif.
Oiv 068	Nombre de lobes	1-F. entière	<u>2-trois</u>	3-cinq	4-sept	5- + de sept
Oiv 069	Couleur face supérieure limbe <i>vert</i>		vert clair	<u>vert moyen</u>	vert foncé	
Oiv 070	Distribution de la pigmentation anthocyanique des nervures principales, face supérieure du limbe	<u>1- nulle</u>	2- seulement au point pétiole	3- jusqu'à 1 <sup>ère</sup> bifurc.	4- - jusqu'à 2 <sup>ème</sup> bifurc.	5- - au-delà de la 2 <sup>ème</sup> bifurc
Oiv 071	Distribution de la pigmentation anthocyanique des nervures principales, face inférieure du limbe	<u>1- nulle</u>	2- seulement au point pétiole	3- jusqu'à 1 <sup>ère</sup> bifurc.	4- - jusqu'à 2 <sup>ème</sup> bifurc.	5- - au-delà de la 2 <sup>ème</sup> bifurc
Oiv 074	Profil du limbe	1-plan	2-en V	3-involuté	<u>4-révoluté</u>	5-tourmenté
Oiv 073	Ondulation du limbe (entre nerv I ou II)	<u>absente</u>				présente
Oiv 072	Gaufrure du limbe (dépression entre nervures I et II)	<u>absente ou t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 075	Cloûre de la face sup. du limbe (relief entre nervures de dernier ordre)	nulle à t. fb.	<u>faible</u>	moyenne	forte	très forte
Oiv 084	Densité p. couchés entre nerv. face inf.	nulle à t. fb.	faible	<u>moyenne</u>	forte	très forte
Oiv 085	Densité p. dressés entre nerv. face inf.	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 086	Densité p. couchés des nerv. face inf.	nulle à t. fb.	<u>faible</u>	moyenne	forte	très forte
Oiv 087	Densité p. dressés des nerv. face inf.	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 088	Villosité couchée nerv.principales face sup	<u>absente</u>				présente
Oiv 089	Villosité dressée nerv. principales face sup	<u>absente</u>				présente
000-44	Densité p. couchés limbe face sup.	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
000-45	Densité p. dressés limbe face sup.	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte

PETIOLE						
Oiv 090	Densité poils couchés sur le pétiole	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 091	Densité poils dressés sur le pétiole	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 093	Longueur pétiole p/r nervure médiane	plus court	<u>légèrement plus court</u>	égal	légèrement plus long	plus long
000-06	Couleur du pétiole	1-coloré	2-partiellement coloré	<u>3-vert</u>		

SINUS PETIOLAIRE (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)						
Oiv 079	Degré d'ouverture/chevauchement du sinus pétiole	très ouvert	<u>ouvert</u>	fermé	chevauchant	très chevauchant
Oiv 080	Forme de la base du sinus pétiole	1- en U	2- en accolade	<u>3- en V</u>		
Oiv 81-1	Dent dans la sinus pétiole	<u>absents</u>				présents
Oiv 81-2	Base du sinus pétiole limité par la nervure	<u>1- non limité</u>	2- sur un côté	3- sur les deux côtés		

SINUS LATÉRAUX SUPÉRIEURS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)						
Oiv 082	Degré d'ouverture/chevauchement des sinus latéraux supérieurs	<u>1- ouverts</u>	2- fermés	3- légèrement chevauchants	4- très chevauchants	5- absence de sinus
Oiv 094	Profondeur des sinus latéraux supérieurs	Absence ou très peu profond	<u>peu profond</u>	moyens	profonds	très profonds
Oiv 83-1	Forme de la base des sinus latéraux supérieurs	1- en U	2- en accolade	<u>3- en V</u>		
Oiv 83-2	Dent dans les sinus latéraux supérieurs	<u>absentes</u>	<u>2?</u>			présents

DENTS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)						
Oiv 076	Forme des dents	1- à deux côtés concaves	<u>2- à deux côtés rectilignes</u>	3- à deux côtés convexes	4- un côtés concaves un côtés convexes	5- mélange notation 2 et notation 3
Oiv 077	Taille des dents par rapport à la taille du limbe	très petites	<u>petites</u>	moyennes	grandes	très grandes
Oiv 078	Longueur des dents par rapport à leur largeur	très courtes	<u>courtes</u>	moyennes	longues	très longues

AUTRE CARACTÈRE OBSERVABLE À CETTE PÉRIODE						
Oiv 501	Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.)	Très faible (<10%)	Faible (11-30%)	<u>Moyen (31-50%)</u>	Élevé (51-70%)	Très élevé (>80%)

7R 5186-190 (OMlp2225) → 5/15 = 110R → ARRACHER (4)



**Formulaire de description 4 / 8**  
Observation entre stades de nouaison et de véraison

Année : 2015 + 2016

Observateur : LACOMBE

Code cépage :

Code introduction :

Nom introduction : CUALTACCIV E13

Emplacement : Espiguettes 86R2 s 221-230

LIMBE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 065	Taille du limbe	très petite	petite	moyenne	grande	très grande
Oiv 067	Forme du limbe	1-cordiforme	2-cunéiforme	3-pentagon.	4-orbicul	5-rénif.
Oiv 068	Nombre de lobes Variable	1-F. entière	2-trois	3-cinq	4-sept	5- + de sept
Oiv 069	Couleur face supérieure limbe		vert clair	vert moyen	vert foncé	
Oiv 070	Distribution de la pigmentation anthocyanique des nervures principales, face supérieure du limbe	1- nulle	2- seulement au point pétioilaire	3- jusqu'à 1 <sup>ère</sup> bifurc.	4- jusqu'à 2 <sup>ème</sup> bifurc.	5- - au-delà de la 2 <sup>ème</sup> bifurc
Oiv 071	Distribution de la pigmentation anthocyanique des nervures principales, face inférieure du limbe	1- nulle	2- seulement au point pétioilaire	3- jusqu'à 1 <sup>ère</sup> bifurc.	4- jusqu'à 2 <sup>ème</sup> bifurc.	5- - au-delà de la 2 <sup>ème</sup> bifurc
Oiv 074	Profil du limbe	1-plan	2-en V	3-involuté	4-révoluté	5-tourmenté
Oiv 073	Ondulation du limbe (entre nerv I ou II)	absente				présente
Oiv 072	Gaufre du limbe (dépression entre nervures I et II)	absente ou t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 075	Cloûre de la face sup. du limbe (relief entre nervures de dernier ordre)	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 084	Densité p. couchés entre nerv. face inf.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 085	Densité p. dressés entre nerv. face inf.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 086	Densité p. couchés des nerv. face inf.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 087	Densité p. dressés des nerv. face inf.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 088	Villosité couchée nerv.principales face sup	absente				présente
Oiv 089	Villosité dressée nerv. principales face sup	absente				présente
000-44	Densité p. couchés limbe face sup.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
000-45	Densité p. dressés limbe face sup.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte

PETIOLE						
Oiv 090	Densité poils couchés sur le pétiole	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 091	Densité poils dressés sur le pétiole	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 093	Longueur pétiole p/r nervure médiane	plus court	légèrement plus court	égal	légèrement plus long	plus long
000-06	Couleur du pétiole	1-coloré	2-partiellement coloré	3-vert		

**SINUS PETIOLAIRE** (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 079	Degré d'ouverture/chevauchement du sinus pétioilaire	très ouvert	ouvert	fermé	chevauchant	très chevauchant
Oiv 080	Forme de la base du sinus pétioilaire	1- en U	2- en accolade	3- en V		
Oiv 81-1	Dent dans la sinus pétioilaire	absents				présents
Oiv 81-2	Base du sinus pétioilaire limité par la nervure	1- non limité	2- sur un côté	3- sur les deux côtés		

**SINUS LATÉRAUX SUPÉRIEURS** (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 082	Degré d'ouverture/chevauchement des sinus latéraux supérieurs	1- ouverts	2- fermés	3- légèrement chevauchants	4- très chevauchants	5- absence de sinus
Oiv 094	Profondeur des sinus latéraux supérieurs	Absence ou très peu profond	peu profond	moyens	profonds	très profonds
Oiv 83-1	Forme de la base des sinus latéraux supérieurs	1- en U	2- en accolade	3- en V	les deux à la fois	
Oiv 83-2	Dent dans les sinus latéraux supérieurs	absentes				présents

**DENTS** (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 076	Forme des dents	1- à deux côtés concaves	2- à deux côtés rectilignes	3- à deux côtés convexes	4- un côtés concaves un côtés convexes	5- mélange notation 2 et notation 3
Oiv 077	Taille des dents par rapport à la taille du limbe	très petites	petites	moyennes	grandes	très grandes
Oiv 078	Longueur des dents par rapport à leur largeur	très courtes	courtes	moyennes	longues	très longues

**AUTRE CARACTÈRE OBSERVABLE À CETTE PÉRIODE**

Oiv 501	Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.)	Très faible (<10%)	Faible (11-30%)	Moyen (31-50%)	Élevé (51-70%)	Très élevé (>80%)
---------	--	--------------------	-----------------	----------------	----------------	-------------------



# Formulaire de description 5 / 8

Observation à maturité physiologique

Année : 2015

Observateur : LACOMBE

Code cépage :

Code introduction :

Nom introduction : CUALTACCIO B E13

Emplacement : Espiguelte 82R7A281-290

(+86R2A221-230)

## GRAPPE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 202	Longueur sans pédoncule Valeur absolue (en cm) : 18	très courte (<10 cm)	courte (10-14 cm)	moyenne (14-18 cm)	longue (18-25 cm)	très longue (>25 cm)
Oiv 203	Largeur Valeur absolue (en cm) : 12	très étroite (<5 cm)	étroite (5-10 cm)	moyenne (10-15 cm)	large (15-20 cm)	très large (>20 cm)
Oiv 204	Compacité	très lâche	lâche	moyenne	compacte	très compacte
000-46	Millerandage	nul ou t. fb.	faible	moyen	fort	très fort
Oiv 206	Longueur du pédoncule Valeur absolue (en cm) : 3	très court (<3 cm)	court (3-5 cm)	moyen (5-7 cm)	long (7-10 cm)	très long (>10 cm)
Oiv 207	Lignification du pédoncule	à la base seulement		jusqu'à la moitié	plus de la moitié	
000-11	Couleur de l'axe de la rafle	1-coloré	2-non color			
Oiv 208	Forme de la grappe	1-cylindrique	2-conique	3-en entonnoir		
Oiv 209	Nombre d'ailes de la grappe principale	1-absentes	2- Une à deux ailes	3- trois à quatre ailes	4- cinq à six ailes	5- plus de six ailes

## BAIE

Oiv 220	Longueur Valeur absolue (en mm) : 20				très courte (<8mm)	courte (8-14mm)	moyenne (14-20mm)	longue (20-26mm)	très longue (>26mm)		
Oiv 221	Largeur Valeur absolue (en mm) : 19				très étroite (<8mm)	étroite (8-14mm)	moyenne (14-20mm)	large (20-26mm)	très large (>26mm)		
Oiv 222	Uniformité de la grosseur				1-non uniforme	3-uniforme					
Oiv 223	Forme	1- sphérique aplatie	2- sphérique	3- elliptique courte	4- elliptique longue	5- cylindriq ue	6- troncovoï de	7- ovoïde	8- obovoïde	9- arquée	10- fusiforme
Oiv 225	Couleur épiderme qq grains stomatés suberés			1- vert jaune	2- rose	3- rouge	4- gris	5-rouge foncé violet	6- bleu noir		
Oiv 226	Uniformité couleur épiderme				1- non uniforme	3- uniforme					
Oiv 227	Pruine				nul ou t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte		
Oiv 228	Epaisseur pellicule				très mince	mince	moyenne	épaisse	très épaisse		
Oiv 229	Ombilic (apparence)				1- peu apparent	2- apparent					
000-18	Région ombilicale (dépression)				1- déprimée	2- non déprimée					
Oiv 230	Coloration de la pulpe				1-non colorée	2- colorée					
Oiv 231	Intensité de la pigmentation anthocianique de la pulpe				nul ou t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte		
Oiv 232	Succulence de la pulpe				1- peu juteuse	2- moyenneme nt juteuse	3- très juteuse				
Oiv 233	Rendement en jus (ml / 100g baies)					faible	moyen	élevé			
Oiv 235	Fermeté de la pulpe				1- molle	2- légèrement ferme	3- très ferme				
Oiv 236	Saveur				1-aucune	2- muscatée	3- foxée	4- herbacée	5-autre		
Oiv 238	Longueur pédicelle				très court (<4mm)	court (4-8mm)	moyen (8-12mm)	long (12-16mm)	très long (>16mm)		
Oiv 240	Séparation du pédicelle				1- très facile	2- facile	3- difficile				

## PEPINS

Oiv 241	Formation des pépins	1- absente (type corinthien)		2- rudimentaire (type sultanien)		3-complète
Oiv 242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm) : <u>6</u>	très courts	courts	moyens	longs	très longs
Oiv 243	Poids des pépins (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm) : _____	très faible (<10mg)	faible (25mg)	moyen (40mg)	élevé (55mg)	très élevé (>65mg)
Oiv 244	Cannelures transversales face dorsale pépins	1-absentes	2-présentes			

vu MATURITÉ le 04/09, comme Ugni Blanc  
avant Cabernet Sauvignon et après Mondeuse noire



Formulaire de description 5 / 8  
Observation à maturité physiologique

Année :  
Code cépage : Code introduction : **OMt p2183**  
Nom introduction : **CUATTACCIU E13**  
Observateur : **+ 7575181-185 Jean**  
Emplacement : **7895181-185 encrepue**

GRAPPE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
<b>Oiv 202</b>	Longueur sans pédoncule Valeur absolue (en cm) : -----	très courte (<10 cm)	courte (10-14 cm)	moyenne (14-18 cm)	longue (18-25 cm)	très longue (>25 cm)
Oiv 203	Largeur Valeur absolue (en cm) : -----	très étroite (<5 cm)	étroite (5-10 cm)	moyenne (10-15 cm)	large (15-20 cm)	très large (>20 cm)
<b>Oiv 204</b>	Compacité	très lâche	lâche	moyenne	compacte	très compacte
000-46	Millerandage	nul ou t. fb.	faible	moyen	fort	très fort
<b>Oiv 206</b>	Longueur du pédoncule Valeur absolue (en cm) : -----	très court (<3 cm)	court (3-5 cm)	moyen (5-7 cm)	long (7-10 cm)	très long (>10 cm)
Oiv 207	Lignification du pédoncule	à la base seulement		jusqu'à la moitié	plus de la moitié	
000-11	Couleur de l'axe de la rafle	1-coloré	2-non color			
<b>Oiv 208</b>	Forme de la grappe	1- cylindrique	2-conique	3-en entonnoir		
<b>Oiv 209</b>	Nombre d'ailes de la grappe principale	1-absentes	2- Une à deux ailes	3- trois à quatre ailes	4- cinq à six ailes	5- plus de six ailes

BAIE

<b>Oiv 220</b>	Longueur Valeur absolue (en mm) : _____					très courte (<8mm)	courte (8-14mm)	moyenne (14-20mm)	longue (20-26mm)	très longue (>26mm)	
<b>Oiv 221</b>	Largeur Valeur absolue (en mm) : _____					très étroite (<8mm)	étroite (8-14mm)	moyenne (14-20mm)	large (20-26mm)	très large (>26mm)	
Oiv 222	Uniformité de la grosseur					1-non uniforme	3-uniforme				
<b>Oiv 223</b>	Forme	1- sphérique aplatie	2- sphérique	3- elliptique courte	4- elliptique longue	5- cylindriq ue	6- troncovoï de	7- ovoïde	8- obovoïde	9- arquée	10- fusiforme
<b>Oiv 225</b>	Couleur épiderme			1- vert jaune	2- rose	3- rouge	4- gris	5-rouge foncé violet	6- bleu noir		
Oiv 226	Uniformité couleur épiderme				1- non uniforme	3- uniforme					
Oiv 227	Pruine				nul ou t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte		
Oiv 228	Epaisseur pellicule				très mince	mince	moyenne	épaisse	très épaisse		
Oiv 229	Ombilic (apparence)				1- peu apparent	2- apparent					
000-18	Région ombilicale (dépression)				1- déprimée	2- non déprimée					
Oiv 230	Coloration de la pulpe				1-non colorée	2- colorée					
<b>Oiv 231</b>	Intensité de la pigmentation anthocianique de la pulpe				nul ou t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte		
Oiv 232	Succulence de la pulpe				1- peu juteuse	2- moyenneme nt juteuse	3- très juteuse				
Oiv 233	Rendement en jus (ml / 100g baies)					faible	moyen	élevé			
<b>Oiv 235</b>	Fermeté de la pulpe				1- molle	2- légèrement ferme	3- très ferme				
<b>Oiv 236</b>	Saveur				1-aucune	2- muscatée	3- foxée	4- herbacée	5-autre		
Oiv 238	Longueur pédicelle				très court (<4mm)	court (4-8mm)	moyen (8-12mm)	long (12-16mm)	très long (>16mm)		
Oiv 240	Séparation du pédicelle				1- très facile	2- facile	3- difficile				

PEPINS

Oiv 241	Formation des pépins	1- absente (type corinthien)		2- rudimentaire (type sultanien)		3-complète
Oiv 242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm) : -----	très courts	courts	moyens	longs	très longs
Oiv 243	Poids des pépins (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm) : -----	très faible ( $<10\text{mg}$ )	faible ( $25\text{mg}$ )	moyen ( $40\text{mg}$ )	élevé ( $55\text{mg}$ )	très élevé ( $>65\text{mg}$ )
Oiv 244	Cannelures transversales face dorsale pépins	1-absentes	2-présentes			



**Formulaire de description 6 / 8**  
(après chute des feuilles)

Année : 2015 + 1<sup>re</sup> décembre 2016

Code cépage : 3050 Code introduction : OMT 2189

Nom introduction : CUALTACCIO E13

Observateur :

+ 7R7A181-185

Emplacement : 7R09A181-185 ←

**Sarment**

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 101	Section transversale	1-circulaire	2-elliptique	3- aplatie		
Oiv 102	Relief de la surface	1- uni	2- côtelé	3- strié		
Oiv 103	Couleur générale	1- jaune	2- brunâtre	3- rouge violacé	4- gris	
Oiv 104	Lenticelles	absentes				présentes
Oiv 105	Poils dressés des nœuds	absents				présents
Oiv 106	Poils dressés des entrenœuds	absents				présents
Oiv 351	Vigueur du rameau*	très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 352	Croissance prompts-bourgeons	absent ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 353	Longueur entrenœuds Valeur absolue (en mm) : 120	très courts (<60mm)	courts (90mm)	moyens (120mm)	longs (150mm)	très longs (>180mm)
Oiv 354	Diamètre entrenœuds Valeur absolue (en mm) : 130	très petit (<5mm)	petit (8mm)	moyen (11mm)	grand (14mm)	très grand (>17mm)

**Suppléments pour Porte-greffe**

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 551	Rendement en bois/ha	très faible	faible	moyen	élevé	très élevé
Oiv 552	Formation de cal de soudure	très faible	faible	moyen	élevé	très élevé
Oiv 553	Aptitude à la rhizogenèse	très faible	faible	moyen	élevé	très élevé

**Vassal**

000-47	Epaisseur des nœuds par rapport au mérithalle	1- aplatis	2- moyens	3- saillants		
000-48	Pruine sur sarment	1- absence	2- partiellement présente	3- présente		

\* voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »

